

本校 BNT 第二劑疫苗接種通知

意願書請先參見下附範本，待中央發放後將立即發給學生

- 一、依據教育部國民及學前教育署 110 年 12 月 3 日臺教國署學字第 1100163930 號函及 110 年 12 月 6 日北市教體字第 1103111880 號函示辦理。
- 二、本校訂於 12 月 24 日進行校園集中接種作業，施打醫療院所為三軍總醫院。新版 BNT 接種意願書(範例如附件)將於中央發放後立即發給學生帶回，請家長先行詳細閱讀接種須知。。
- 三、高三學生如考量學測，未選擇於校園集中接種作業，台北市教育局將於學測結束後安排專場集中施打，相關資訊另行公告。
- 四、未選擇於校園集中接種作業及國小年滿 12 歲之學生，可由家長至「COVID-19 公費疫苗預約平台」進行意願登記 BNT COVID-19 疫苗，後續依指揮中心公告時程，符合預約資格者或收到簡訊提醒，即可預約登錄接種，由家長（監護人或關係人）陪同學生/青少年至合約醫療院所完成 疫苗接種。

家長若有疑問請於上班時間電洽健康中心 02-26308889-522、506

12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議

1. 由於COVID-19病毒變異株持續於國際間流行，為提升社區群體免疫力，為確保國內防疫安全，國人應按時程接種第2劑COVID-19疫苗，並建議已接種第1劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應之12-17歲青少年族群，間隔12週以上，接種第2劑BNT疫苗
2. 接種第2劑後發生心肌炎/心包膜炎之比率高於第1劑，且年輕男性發生比例較高。提醒民衆於接種BNT疫苗後28天內，如出現下列任一疑似症狀，應立即就醫
症狀包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或“顫動”)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等

青少年接種COVID-19第2劑BNT間隔時間建議為12週以上

- 1 目前研究顯示，第2劑BNT疫苗延長至6-14週接種，並不會影響疫苗引起之抗體及細胞性免疫。
- 2 根據加拿大、歐盟及英國監測數據顯示，延長第2劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，惟2劑接種間隔與心肌炎發生比率之關聯性尚未被證實。
- 3 目前英國建議16-17歲青少年接種2劑BNT疫苗，2劑間隔12週以上。

12-17歲青少年接種BNT第2劑疫苗後相關不良反應

- 1 接種完第2劑COVID-19 mRNA疫苗後，不良反應發生比率會比第1劑高。
- 2 心肌炎/心包膜炎為較須注意的不良反應，於年輕男性發生比例較高。提醒民衆於接種BNT疫苗後28天內，如出現胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或「顫動」、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等疑似症狀，應立即就醫。

※其他接種疫苗後反應：多為接種部位腫痛、疲倦、頭痛、肌肉關節痠痛、噁心、畏寒、體溫升高、發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)等，一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫病因。